

10 opozorilnih znakov

za primarno imunsko pomanjkljivost pri otroku

Primarne imunske pomanjkljivosti pri otrocih in odraslih bolnikih povzročajo ponavljajoče se okužbe ali okužbe, ki so dolgotrajne in jih težko pozdravimo. Pogostnost primarnih imunskih pomanjkljivosti je en bolnik na 500 oseb. Če ima vaš otrok ali nekdo, ki ga poznate, najmanj dva izmed spodaj navedenih opozorilnih znakov, se posvetujte z zdravnikom glede možne prisotnosti primarne imunske pomanjkljivosti.

- 1** Najmanj štiri okužbe ušes v enem letu.
- 2** Najmanj dve težji okužbi sinusov v enem letu.
- 3** Najmanj dva meseca antibiotične terapije z majhnim učinkom.
- 4** Najmanj dve pljučnici v enem letu.
- 5** Zastoj rasti teže in višine pri dojenčku.
- 6** Ponavljajoči se globoki ognojki na koži ali ognojki v notranjih organih.
- 7** Ponavljajoč se soor v ustih ali glivične okužbe na koži.
- 8** Potreba po intravenskih antibiotikih za zdravljenje okužb.
- 9** Najmanj dve globoki okužbi s septikemijo.
- 10** Pozitivna družinska anamneza za primarno imunsko pomanjkljivost.



Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.

