




# ZDRAVLJENJE ANAFILAKSIJE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

Anafilaksija je resna, življenje ogrožajoča generalizirana ali sistemsko preobčutljivostna reakcija (1). ADRENALIN, dan v mišico stegna, je zdravilo izbora pri zdravljenju anafilaksije. Adrenalin je potrebno aplicirati otroku ali mladostniku z anafilaksijo s simptomi in znaki prizadetosti dihal ali srčno-žilnega sistema kot so: HRIPAVOST, LAJAJOČ KAŠELJ, TEŽKO POŽIRANJE, OBČUTEK TEŽKEGA DIHANJA, PISKANJE, CIANOZA, PRENEHANJE DIHANJA, NIZEK KRVNI PRITISK, IZGUBA ZAVESTI, MOTNJE SRČNEGA RITMA ALI SRČNI ZASTOJ (2, 3).



Otroka ali mladostnika z anafilaksijo je potrebno sprejeti v bolnišnico! Priporočamo tudi shranitev seruma za dodatne preiskave (npr. za določitev triptaze).

## Literatura:

- Johansson SGO, Bieber T, Dahl R, Friedmann PS, Lanier B, Lockey R, et al. A revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of World Allergy Organization. J Allergy Clin Immunol 2004; 113: 832–6.
- Muraro A, Roberts G, Clark A, Eigenmann PA, Halken S, Lack G, et al. EAACI Task Force on Anaphylaxis in Children. The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the European academy of allergology and clinical immunology. Allergy 2007; 62: 857-71.
- Vesel T, Koren Jeverica A, Emeršič N, Accetto M, Bizjak R, Obermayer-Temlin A, et al. Smernice za obravnavo otroka in mladostnika z anafilaksijo. Zdrav Vestnik 2014; 83: 425- 35.