

ANAFILAKSIJA

PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

ALERGIJSKA REAKCIJA, KI OGROŽA ŽIVLJENJE

POGOSTI VZROKI ANAFILAKSIJE

1 HRANA

ARAŠIDI



OREŠČKI



JAJCA



KRAVJE MLEKO



SOJA



PŠENICA



RIBE



MORSKI SADEŽI

2 PIKI ŽUŽELK (ose, sršeni, čebele)

3 ZDRAVILA ali izpostavljenost LATEKSU

ZNAKI ANAFILAKSIJE

1 KOŽA:

rdečica, srbenje,
koprivnica, otekanje

2

OBTOČILA:

hitro bitje srca,
pri hudi reakciji upočasnitev bitja srca,
oslabljen pulz

3

DIHALA:

kašelj, hripavost,
težko dihanje ali težko govorjenje,
piskanje, pomodrelost,
prenehanje dihanja

4

PREBAVILA:

bolečina v trebuhu,
bruhanje, oteženo požiranje, driska

5

TELO:

oslabelost, umirjenost,
vrtoglavica, glavobol,
občutek strahu, izguba zavesti

PREPOZNAJTE IN UKREPAJTE!

1 Pokličite nujno medicinsko pomoč na telefon 112!

112

2 Položite otroka z anafilaksijo v ležeč položaj s podloženimi nogami. Če bruha, naj leži na boku. Če težko diha, naj sedi. Otrok z anafilaksijo naj NE STOJI.

3 Ob prvih znakih anafilaksije dajte v mišice zunanje zgornje strani stegna ADRENALIN (npr. samoinjektor adrenalina Epipen ali Anapen).



4 Vsakega otroka z anafilaksijo je potrebno odpeljati na opazovanje v bolnišnico, pa čeprav je reakcija že izzvenela in je prejel adrenalin.

H

Za dodatne informacije o ukrepanju pri anafilaksiji se prosim posvetujte z izbranim pediatrom ali pediatrom alergologom.

Pripravili:

Društvo za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi, Sekcija za pediatrično pulmologijo, alergolijo in klinično imunologijo, Alergološka in imunološka sekcija SZD, Delovna skupina pediatrov alergologov, Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Univerzitetna pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana