

10 opozorilnih znakov

za primarno imunsko pomanjkljivost pri odraslem bolniku

Primarne imunske pomanjkljivosti pri otrocih in odraslih bolnikih povzročajo ponavljajoče se okužbe ali okužbe, ki so dolgotrajne in jih težko pozdravimo. Pogostnost primarnih imunskih pomanjkljivosti je en bolnik na 500 oseb. Če imate vi ali nekdo, ki ga poznate, najmanj dva izmed spodaj navedenih opozorilnih znakov, se posvetujte z vašim zdravnikom glede možne prisotnosti primarne imunske pomanjkljivosti.

- 1** Najmanj dve okužbi ušes v enem letu.
- 2** Najmanj dve okužbi sinusov v enem letu ob izključeni alergiji.
- 3** Ena pljučnica letno najmanj dve leti zapored.
- 4** Kronična driska z izgubo telesne teže.
- 5** Ponavljajoče virusne okužbe (nahodi, herpes, bradavice, kondilomi).
- 6** Potreba po intravenskih antibiotikih za zdravljenje okužb.
- 7** Ponavljajoči se globoki ognojki na koži ali ognojki v notranjih organih.
- 8** Trdovratni soor ali glivične okužbe na koži ali drugih mestih.
- 9** Okužba z normalno nenevarnimi atipičnimi mikobakterijami.
- 10** Pozitivna družinska anamneza za primarno imunsko pomanjkljivost.



Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.

